

162 Cigüeñuela común



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Hembra (08-VIII)

CIGÜEÑUELA COMÚN (*Himantopus himantopus*)

IDENTIFICACIÓN

37-38 cm. Dorso oscuro; resto del plumaje blanco, con a veces mancha negra o parda en la cabeza; pico negro; patas de color rojo y muy largas.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

En aves **no juveniles**, **macho** con dorso de color negro; ala mayor de 240 mm. **Hembra** con dorso de color pardo oscuro, contrastando con las coberteras negras del ala; ala menor de 235 mm (**CAUTION:** en **plumaje nupcial**, el diseño de las manchas oscuras de la cabeza es muy variable en ambos sexos; en plumaje **no nupcial** ambos sexos tienen un diseño gris similar). El sexado de **juveniles** dado por algunos autores (**macho** con coberteras del ala con brillo verde metálico; **hembra** con coberteras del ala sin brillo verde metálico) muestra mucho solapamiento y debe de ser verificado.

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, con raros avistamientos invernales de ejemplares aislados. Nidifica en arrozales y puntos de agua del Valle del Ebro y Sistema Ibérico.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juveniles con plumaje nuevo; partes superiores e infracoberteras del ala con plumas moteadas; primarias internas y secundarias con manchas blancas en la punta; iris amarillo marrón; patas rojo pálido.

2º año con plumas de vuelo juveniles, que están desgastadas y mantienen las puntas blancas; mantienen algunas pequeñas y medianas coberteras **juveniles**.


Adultos con partes superiores y coberteras del ala sin plumas moteadas; primarias internas con pequeño borde gris; iris y patas rojos.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que queda suspendida antes de la migración y termina en las áreas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas del cuerpo, el par central de plumas de la cola y todas o parte de pequeñas y medianas coberteras; comienza en Julio y termina en las zonas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que abarca las plumas corporales.


FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Macho ()


162 Cigüeñuela común




Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Macho ()



Cigüeñuela común. Verano. Pollo (22-VI)



Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Hembra ()





Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (); abajo hembra (08-VIII)



Cigüeñuela común. Verano. Juvenil (21-VII).




162 Cigüeñuela común



Cigüeñuela común. Verano. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Verano. Diseño de la nuca: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Diseño de la nuca: izquierda macho (); derecha hembra (08-VIII)




Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (); derecha hembra (08-VIII)

162 Cigüeñuela común



Cigüeñuela común. Verano. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).

Cigüeñuela común. Verano. Diseño del pecho: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (); abajo hembra (08-VIII)



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (08-VIII)

162 Cigüeñuela común



Cigüeñuela común. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).

Cigüeñuela común. Verano. Diseño de las patas: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (); abajo juvenil (21.VII).



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Diseño de las patas: arriba macho (); abajo hembra (08-VIII)




Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (08-VIII)

162 Cigüeñuela común




Cigüeñuela común. Verano. Diseño del la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (); izquierda juvenil (21.VII).


Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala (08-VIII).



Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Macho: diseño de las coberteras del ala ().



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala ().




Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Hembra: diseño de las coberteras del ala ().


162 Cigüeñuela común



Cigüeñuela común. Verano. Juvenil: diseño de las coberteras del ala (21-VII).



Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Hembra: diseño de primarias ()




Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Macho: diseño de primarias ()




Cigüeñuela común. Verano. Juvenil: diseño de primarias (21-VII)



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Hembra: diseño de primarias (08-VIII)



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Macho: diseño de secundarias ()




Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Macho: diseño de primarias ()


162 Cigüeñuela común



Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (08-VIII)




Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Macho: diseño de secundarias ()



Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Hembra: diseño de secundarias ()



Cigüeñuela común. Verano. Juvenil: diseño de secundarias (21-VII)





Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala ()





Cigüeñuela común. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (08-VIII)

162 Cigüeñuela común



Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala ()

Cigüeñuela común. Verano. Juvenil: diseño del ala (21-VII)



Cigüeñuela común. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala ()